

Explora Antuco

Guia de la Fauna de Antuco

Anibal Gomez Fuentes



>>Introducción

El nombre Antuco proviene de la legua mapuche “agua y sol” y no existe duda de que el nombre que se bautizó este lugar no podía ser otro. Fundada en el año 1874 para resguardar el paso cordillerano hoy es un pueblo con una población que ronda los 5000 habitantes. Este pueblo posee una gran cantidad de lugares turísticos en los cuales podrán encontrar un espacio de conexión con la naturaleza, recorrer sus cientos de senderos, admirando el paisaje junto con la flora y fauna que nos encontraremos. Siguiendo el camino más arriba, nos encontraremos con el Parque Nacional Laguna del Laja y la Laguna del Laja que es el embalse de agua natural más grande del país, cuya formación se remonta con la erupción del volcán Antuco, la cual generó depósitos de magma que sellaron la salida del agua, generando el embalse natural.

En las montañas de Antuco, yace la Sierra Velluda, que según investigaciones demuestran que es un volcán extinto, ya que su flujo de magma se vio desviado hacia el volcán Antuco. Esta sierra posee glaciares que datan de miles de años atrás.



>>Simbología

Nombre Científico (Autor/es)

CLASE: es un grupo taxonómico que comprende varios órdenes de plantas o animales con muchos caracteres comunes.

ORDEN: se refiere a un orden taxonómico, en el cual se establecen los organismos

FAMILIA: agrupan a los géneros de especies afines, por lo tanto los miembros de una familia suelen estar estrechamente relacionados

Estado de conservación

LC : Menor preocupación

NT : Casi amenazada



VU : Vulnerable

EN : En peligro

CR : En peligro critico

EW : Extinta en estado silvestre

EX : Extinta



1-Pico, 2-Cabeza, 3-Iris, 4-Pupil, 5-Manto, 6-Coberteras menores, 7-Escapularios, 8-Coberteras, 9-Terciarias, 10-Rabadilla, 11-Primarias, 12-Respiradero, 13-Muslo, 14-Articulación tibio-tarsal, 15-Tarso, 16-Dedos, 17-Tibia, 18-Vientre, 19-Flancos, 20-Pecho, 21-Garganta, 22-Zarzo, 23-Eyestripe.

Aves de Antuco

- ▶ Al estar cerca de la cordillera de los Andes, Antuco es un lugar atractivo para una gran cantidad de aves, que buscan refugio en zonas con menor población, actualmente existen más de 30 especies de aves nativas diferentes, algunas se pueden encontrar todo el año y otras solo en época de migración.
- ▶ Las aves indexadas en este libro se pueden encontrar en toda la distribución geográfica de Antuco, incluyendo Alto-Antuco hasta el Parque Nacional Laguna del Laja.
- ▶ A continuación se mostrarán las aves más comunes que pueden ser avistadas en la comuna.

Campephilus magellanicus (King)

CLASE: Aves

ORDEN: Piciformes

FAMILIA: Picidae



Nombre común: carpintero, carpintero negro.

Distribución: en Chile su distribución geográfica se extiende desde la Región del Maule a la Región de Magallanes.

Aspecto físico: Ave de plumaje negro en todo el cuerpo, tamaño desde 38 a 45 cms. El macho presenta toda la cabeza cubierta de plumas de color rojo brillante.

Hábitat: Ave exclusiva del bosque nativo maduro donde se desplaza tras la búsqueda de su alimento, constituido especialmente por larvas de insectos que habitan los troncos de *Nothofagus-Austrocedrus*.

Su canto una vez conocido se hace característico y fácil de reconocer cuando se desplaza volando de un sector a otro. Los golpes que realiza a la corteza de los árboles son otro sonido que es posible detectar a una buena cantidad de metros de distancia. Es difícil ignorar su presencia. Normalmente, el macho y la hembra viajan juntos o en un grupo familiar de unos tres a cinco pájaros. Los Carpinteros Negros son pájaros monógamos y comparten roles iguales en la crianza: ambos excavan nidos, incuban los huevos, empollan, limpian los nidos y alimentan a los polluelos.



Sturnella loyca (Molina)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Icteridae



Nombre común: Loica, lloica.

Distribución: En Chile desde Atacama hasta Magallanes.

Aspecto físico: Ave de pecho rojo intenso en el macho y en la hembra éste se denota más pálido y de cuello blanquecino. Plumaje café jaspeado, pico puntiagudo de color pardo oscuro.

Hábitat: Ave característica de ambientes abiertos del valle central, aún cuando la encontramos desde el nivel del mar hasta la Cordillera de los Andes. Por lo regular no se acerca a las ciudades llegando a lo más a los terrenos abiertos que la limitan.

Fácil de identificar por su gran mancha roja en la parte delantera, la loica se encuentra en gran parte del territorio. Gusta de terrenos bajos y húmedos buscando su alimento tanto en el suelo como en los arbustos. Canto poco variado pero agradable. Solitaria o en pareja, tiende a juntarse en bandadas durante el invierno.

El nido es grande, suelto y formado por pasto seco bien unido y colocado en el suelo muy bien escondido entre pasto alto. Muy cuidado por la hembra, ésta nunca llega directamente al nido, sino que baja cerca de él y camina agachada hasta éste. Al salir, lo hace de igual forma, como una manera de que nadie se entere en donde está.



Curaeus curaeus (Molina)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Icteridae



Nombre común: Tordo.

Distribución: En Chile desde Coquimbo a Magallanes.

Aspecto físico: Ave de tamaño mediano con el cuerpo totalmente cubierto de plumas negras y brillantes. De igual color pico y patas.

Hábitat: Ave frecuente en diversos ambientes naturales o bien intervenidos como sectores rurales dedicadas a los cultivos.

Ave de tamaño mediano que suele desplazarse en bandadas de diverso número de ejemplares. Su presencia se denota con facilidad por lo bullicioso de su comportamiento al escucharse claramente sus expresiones vocales que utilizan para comunicarse entre sí.

Se alimenta de semillas, frutas y pequeños invertebrados

Possible de encontrar en todos los ambientes naturales sean terrenos cultivados, bordes de bosques, cordillera andina. Incluso con cierta frecuencia ingresa a los sectores urbanos habitados por el hombre.



Molothrus bonariensis (Molina)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Icteridae

Nombre común: Mirlo.

Distribución: Desde Copiapó a Aysén.

Aspecto físico: El macho presenta un plumaje negro con hermosa iridiscencia azul, en cambio la hembra presenta un color café, partes inferiores más claras y de menor tamaño que el macho, similar a los juveniles.

Alcanza un tamaño de 29 a 30 cm

Hábitat: El mirlo es un ave frecuente en las ciudades, aunque también habita campos, praderas, valles, etc., hasta unos 2.000 m.s.n.m.

Es gregario, es decir, vive en grupos formando grandes bandadas, frecuentando campos en donde existe ganado. En la ciudad es posible verlo forrageando en las plazas, donde busca en el suelo pequeños invertebrados. En época reproductiva forma parejas y la hembra practica la poliandria (se aparea con varios machos en la temporada) y el parasitismo, vale decir, coloca uno o más huevos en los nidos de otras especies, como chincoles, yales, triles diucas y otras especies. Una de las cosas más especiales de esta especie no construye nido ni tampoco participa en la crianza de sus crías.



Sephanoides sephaniodes (Lesson & Garnot)



CLASE: Aves

ORDEN: Caprimulgiformes

FAMILIA: Trochilidae

Nombre común: Picaflor chico.


Distribución: Atacama a Tierra del Fuego; y en la isla Robinson Crusoe del archipiélago de Juan Fernández.

Aspecto físico: Macho: Cabeza verde con corona roja anaranjada iridiscente. Mancha blanca post-ocular. Garganta verde con manchitas bronceadas brillantes. Por encima verde con brillo bronceado. Por debajo verde grisáceo. Flancos y cola verdes bronceados. Pico recto negro. Hembra: Similar al macho pero corona sin el brillo rojo; medidas algo menores de alas, cola y pico.

Alcanza un tamaño de 11 cm.

Hábitat: Habita en bosques, quebradas aguadas, jardines y, en general, lugares floridos. Realiza una migración parcial hacia la zona sur de Chile en verano.

Es la segunda ave más chica de Chile, después del Picaflor de Arica que mide 8 cm. de largo. En la mayor parte de su zona de distribución es ave residente, sin embargo, en el extremo sur desaparece en el invierno, apareciendo en Atacama en donde sólo se conoce como visitante de invierno, lo que obviamente implica una migración estacional. El colibrí extrae néctar de varias flores y es capaz de recordar la ubicación de las flores con mas néctar



Geranoaetus melanoleucus (Swann)

CLASE: Aves

ORDEN: Accipitriformes

FAMILIA: Accipitridae



Nombre común: Águila chilena, Águila mora, gavilán.

Distribución: Cordillera de los Andes entre Arica a Iquique y desde Caldera a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Tiene una cabeza pequeña de color negro azulado, al igual que su pecho, dorso y cola. Su garganta, abdomen y largas y gruesas patas son de color blanco, aunque sus dedos y garras tienen un color amarillento. Su pico es curvo y ganchudo. Es de color azulado en la punta y amarillo en base. Alcanza un tamaño de 70 a 90 cm.

Hábitat: Habita principalmente zonas bajas de las cordilleras de la zona central; laderas vegetadas, estepas arbustivas y bosques, hasta los 2.200 m.s.n.m.

Es un ave rapaz, esquiva y desconfiada, por lo que difícilmente se le puede ver de cerca. Le gusta volar aprovechando las corrientes de aire, pudiendo versele en grandes planeos circulares. Caza con sus poderosas patas, luego mata a su presa con sus fuertes uñas o dándole golpes con su pico, para luego llevarlos a su nido para comérselo o alimentar a su familia.



Troglodytes aedon (Vieillot)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Troglodytidae

Nombre común: Chercán.

Distribución: En Chile se encuentran desde el Valle del Huasco (al sur de Atacama) hasta Cabo de Hornos.

Aspecto físico: Su cabeza es parda con rayas longitudinales negras y blancas. Su pecho y abdomen es de color café claro. Tiene cola café con barritas negras y su pico y patas son cónicos.

Alcanza un tamaño de 11 a 12 cm.

Hábitat: Suele encontrarse en los bordes de totorales, vegas, prados húmedos, pantanos, bordes de ríos y similares.

Es una de las aves más comunes del territorio, habitando en casi cualquier lugar de su zona de distribución. Por su pequeño tamaño, su cola levantada y su grito áspero y fuerte, se le puede identificar fácilmente, aún mientras se desliza dentro de los tupidos arbustos y matorrales.



Sylviorthorhynchus desmursii (Gay)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Furnariidae

Nombre común: Colilarga.

Distribución: Entre la Región de Coquimbo y la Región de Magallanes.

Aspecto físico: Cabeza rufo pardusca con frente y corona delantera rojiza. Dorso y lomo rufo pardusco. Garganta y pecho amarillentos, aclarando a blanquecino hacia el abdomen. Alas de tono similar al dorso, con las barbas externas de las rémiges acaneladas. Cola muy característica, con las 2 rectrices centrales muy largas (2/3 del largo total del ave) y barbas más notorias hacia las puntas; las 2 del medio, de la mitad del largo de las centrales; y las 2 externas muy cortas.

Alcanza un tamaño 24 cms.

Hábitat: zonas húmedas y tupidas de bosques, selvas y matorrales densos.

Ave pequeña, que no posee dimorfismo sexual, por lo que ambos sexos son de coloración general rojiza pardusca. Destaca su cola muy larga, hasta 2 veces el cuerpo, característica que la hace inconfundible. Se alimenta de insectos que obtiene moviéndose entre la vegetación densa. Es un ave muy activa, territorial y bulliciosa. Cuando se siente amenazada realiza un repetitivo trino de alerta, que delata su presencia. Por sus colores y tamaño, se podría confundir a simple vista con un Chercán.



Zonotrichia capensis (Vieillot)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Emberizidae



Nombre común: Chincol, copete.

Distribución: En Chile se encuentran desde Caldera (Atacama) a las Islas Guaitecas.

Aspecto físico: Cabeza gris, con 3 líneas negras a cada lado que parten desde la base del pico hacia la nuca, una a la altura de la corona, otra en la línea de los ojos y la tercera en la línea de la mandíbula inferior. Plumas de la corona levantadas a modo de copete. Garganta blanquecina. Gran mancha rufa que rodea el cuello excepto en la línea divisoria entre la garganta y pecho. Pecho café claro terroso. Abdomen blanquecino. Manto y lomo pardo con líneas longitudinales negras. Cola parda. Patas y pico cárneos. La hembra es de tonos más apagados y sin las plumas levantadas de la corona.

Alcanza un tamaño de 14 a 15 cm.

Hábitat: Habita en todos los lugares, campos, cerros, huertos, jardines, plazas. Desde la costa hasta unos 2.000 m.s.n.m.

El nido lo coloca en cualquier arbusto, árbol chico o matorral, a 1 o 2 m. de altura, aunque a veces lo hace en el suelo escondido entre el pasto. Ave muy amistosa y básicamente insectívora.

Si bien en el campo sigue siendo numeroso, en la ciudad ha tenido que cederle terreno al Gorrión, ave europea traída por primera vez en 1904, y que se propagó con extraordinaria rapidez, primero por toda la zona central y actualmente por todo Chile.



Colorhamphus parvirostris (Darwin)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae

Nombre común: Vuidita.

Distribución: Coquimbo a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza gris pardusca oscura; lados de la cara grisáceos. Dorso, lomo y supracaudales pardo oliváceo. Garganta y pecho grisáceos; abdomen, subcaudales y flancos grisáceos lavados de amarillento. Alas pardo negruzcas con cobertoras ribeteadas de acanelado formando dos barras transversales de ese color. Cola pardo negruzca. Pico negro, corto y fino. Patas negras.

Alcanza un tamaño de 14 a 18 cm.

Hábitat: Arbórea, en bordes de bosques y cercanías de aguas.

Nidifica en la zona sur-austral del territorio, desde Valdivia a Tierra del Fuego. En invierno, migra hacia la zona norte llegando hasta Coquimbo, en donde es posible encontrarla aunque no en abundancia, en los valles y quebradas de la pre-cordillera, zonas costeras e incluso en jardines de ciudades. Suele pasar bastante tiempo entre el follaje más alto de los árboles, volando cortas distancias. Ave básicamente insectívora.

Su vocalización, un silbido agudo, monosilábico y melancólico, es muy característico, lo que permite su identificación.



Aphrastura spinicauda (Gmelin)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Furnariidae

Nombre común: Comesobo chico, bullicioso, yiqui-yiqui, rayadito.

Distribución: Coquimbo a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza negra; gran superciliar amarillenta desde la base del pico a la nuca. Dorso pardusco; lomo rufo amarillento. Garganta blanca. Pecho y abdomen blanquecino. Alas negruzcas con base rojiza; cubiertas negras con bordes café amarillento. Rectrices rufas; las exteriores con café oscuro en la base; todas sin barbas en la punta semejando espinas. Pico oscuro corto y fino. Alcanza un tamaño de 13 a 15 cm.

Hábitat: Bosques templados del sur. Localmente en tierras bajas áridas con matorral. 0 - 1.200 msnm.; localmente hasta los 2.000.

Características son las largas plumas de la cola con su extremo "pelado", es decir sin barbas, lo que da la impresión de tener una cola espinosa. Tiene las partes inferiores de color blanco grisáceo algo leonado hacia los flancos.

Se alimenta de insectos que obtiene entre el follaje, líquenes, ramas y troncos principalmente de sotobosque. A veces desde el suelo. Bulliciosa y gregaria, esta ave se caracteriza por agruparse en bandadas con ejemplares de su especie u otras, con las que recorre incasablemente los troncos y ramas de los árboles en busca de alimento



Glaucidium nanum (King)



CLASE: Aves

ORDEN: Strigiformes

FAMILIA: Strigidae

Nombre común: Chuncho.

Distribución: Desde Tarapacá hasta Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza, dorso y cobertoras gris pardo con algo de castaño y manchitas claras a blancas. Garganta blanca. Pecho y abdomen con rayas gruesas longitudinales blanquecinas, pardas y negruzcas. Dibujo similar a un collar en la nuca a veces poco visible, de pecas con negro o a veces solo negro. Cola con bandas transversales negruzcas y castañas. Pico corto ganchudo, oscuro en su base y punta amarillenta. Ojos grandes amarillos.

Alcanza un tamaño de 20 cm.

Hábitat: Habita bosques, llanuras y cordilleras hasta los 2.000 m.s.n.m.

Curiosamente, a diferencia de las demás lechuzas y búhos, los chunchos son aves rapaces diurnas, suelen anidar entre septiembre y noviembre en huecos de árboles. Su pequeño tamaño, su vuelo silencioso y su inmovilidad en la rama donde se posa lo hacen pasar inadvertido. Se alimenta de aves, insectos, mamíferos y reptiles. Agresivo y feroz, caza animales incluso más grandes que él, matándolos rápidamente con sus pequeñas pero poderosas garras.



Callipepla californica (Shaw)

CLASE: Aves

ORDEN: Galliformes

FAMILIA: Odontophoridaeae



Nombre común: Codorniz, Tococo, Chancaca.

Distribución: Desde la región de Atacama a la región de los Ríos.

Aspecto físico: Macho de copete de plumas negras curvadas hacia la frente. Garganta y cuello negro con collar de plumas blancas. Pecho plomizo y jaspeado con blanco hacia el abdomen. Hembra de plumaje grisáceo y penacho más pequeño. De aspecto fácil de reconocer especialmente por el copete de plumas negras que presenta el macho.

Alcanza un tamaño de 24 a 27 cm.

Hábitat: Habitante de los campos y quebradas con matorrales.

Es un ave introducida que fue traída hacia el año 1870 desde su originaria California, Estados Unidos de Norteamérica, distribuyéndose por gran parte del territorio nacional, siendo frecuente en especial en la zona central de Chile. De comportamiento esquivo ha sabido desarrollarse sin inconvenientes aún cuando es una pieza de caza bastante apetecida en el sector campesino. Utiliza en su beneficio los matorrales para su protección.

Se alimenta de numerosas especies de granos, algunos de interés agrícola como el trigo. También consume pequeños invertebrados como insectos y caracoles.



Diuca diuca (Molina)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Thraupidae



Nombre común: Diuca.

Distribución: En Chile habitan tres subespecies: la Diuca (*Diuca diuca diuca*) habita desde Coquimbo hasta Magallanes; la Diuca del Norte (*Diuca diuca crassirostris*) desde Antofagasta hasta Coquimbo; y la Diuca de Chiloé (*Diuca diuca chiloensis*) habita sólo en Chiloé. También está introducida en Isla de Pascua.

Aspecto físico: Su coloración general es gris con mancha blanca en la garganta y abdomen y sectores acanelados en el bajo vientre. Sus plumas subcaudales son blancas con bordes acanelados. Sus alas y cola son negruzcas, esta última con mancha blanca en la parte terminal.

Alcanza un tamaño de 17 a 18 cm.

Hábitat: Habita en toda clase de ambientes, desde campos, pueblos, cerros, quebradas y bosques, hasta plazas de ciudades.

Es una de las aves más abundantes y conocidas del territorio, ya que se encuentra en gran número dentro de su zona de distribución y durante todo el año. Anidan en arbustos y árboles chicos.

Se alimentan básicamente de semillas y granos, aunque también se alimentan de insectos y arácnidos. Les gusta desplazarse caminando por campos de cultivo, bordeando bosques, en jardines, laderas de cerros, quebradas, bordes de ríos y también posarse en cercos, alambrados y arbustos. Buscan su alimento en el suelo y entre la vegetación.

Es un ave muy cantora que emite un sonido característico y muy melodioso.



Vultur gryphus (Molina)

CLASE: Aves

ORDEN: Carthatiformes

FAMILIA: Cathartidae



Nombre común: Cónedor.

Distribución: Se distribuye desde el norte de E.E.U.U. hasta el sur de Chile. En Chile se encuentra en todo el territorio desde Arica hasta Punta Arenas.

Aspecto físico: Ave de gran tamaño y envergadura alar. Color predominantemente negro. Macho adulto con cuello de plumas blancas. Juveniles son de plumaje especialmente café. Su plumaje es de color negro oscuro y alrededor de su cuello tiene una corona blanca. Su cabeza, de color rojiza, carece de plumas y los machos tienen una cresta que nace desde la altura de sus ojos hasta su cráneo.

Alcanza los 110 cm. de largo, 1,40 m. de altura y pesa de 11 a 15 kg.

Hábitat: Habita principalmente en las zonas cordilleranas.

Es el ave más grande del mundo. Generalmente vive en pareja o en pequeños grupos. Es un animal carroñero. Cuando divisa un animal muerto sobrevuela en círculos por el lugar donde está su presa. Puede ingerir hasta 5 k. de carne y puede pasar semanas sin ingerir alimento. Alcanza su madurez sexual a los 5 años, a esa edad escoge una pareja única para toda la vida. Las hembras producen un solo huevo por apareamiento.

Muy rara vez ataca a animales vivos (y de hacerlo elige a los recién nacidos, enfermos o moribundos) debido a que se alimenta principalmente de carroña, animales y peces muertos que logra ubicar desde las alturas debido a su vista extraordinariamente aguda.



Nothoprocta perdicaria (Molina)



CLASE: Aves

ORDEN: Tinamiformes

FAMILIA: Tinamidae

Nombre común: Perdiz.

Distribución: Desde el sur de Atacama a Llanquihue.

Aspecto físico: Parecida a una gallinácea de regular tamaño, su plumaje de color café muy variado de negro y blanco en el dorso y lomo, le da un gran mimetismo con su entorno. Esto, sumado a la capacidad para agacharse y mantenerse inmóvil, la hacen muy difícil de observar.

Alcanza los 29 cm. Hembra de mayor tamaño que el macho.

Hábitat: Habita campos de pastizales, matorrales, arbustos bajos y cultivados.

Se mimetiza de manera efectiva con su entorno por lo cual es más factible escuchar su agudo silbido, que lograr verla. De hábitos terrestres y solitaria. Sólo se ve en parejas en época reproductiva.

Muy abundante en tiempos pasados, su sobrevivencia se vió amenazada por la caza indiscriminada debido a su sabrosa carne. Hoy, debido la protección con que cuenta, su número va nuevamente en aumento, pero lejos aún de llegar a la población que había antiguamente.

© Tomasz Doron



Ardea alba (Gmelin)

CLASE: Aves

ORDEN: Pelecaniformes

FAMILIA: Ardeidae



Nombre común: Garza grande.

Distribución: Desde Arica a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Totalmente blanca. Pico puntiagudo amarillo. Iris amarillo. Piernas largas negras y patas negras.

Mide entre 80-104 cm.

Hábitat: Suelen frecuentar zonas de humedales, pantanos, lagos, lagunas, esteros, ríos, embalses, tranques, aunque también se puede ver en ambientes más urbanos como parques con lagunas artificiales.

Aunque habita en todo Chile, es más común en la zona central. También se le encuentra en todo el continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego.

Es un ave muy estilizada de tamaño grande que llega a pesar 1 kilo y medio. Estas aves poseen no poseen dimorfismo sexual.

Estas aves se alimentan de peces, invertebrados, roedores, anfibios y reptiles. Capturan su alimento en forma solitaria, caminando lentamente y muchas veces quedando completamente inmóvil.

De vuelo y aleteo lento, mantiene el cuello encogido y las patas estiradas



Colaptes pitius (Molina)

CLASE: Aves

ORDEN: Piciformes

FAMILIA: Picidae



Nombre común: Pitío.

Distribución: Desde Coquimbo a Magallanes.

Aspecto físico: Cabeza pardo oscuro. Auriculares, mejillas y garganta café leopardo. Dorso y cubiertas alares pardo oscuro ribeteadas de blanco. Lomo blanco. Abdomen algo amarillento. Subalares y axilares amarillo leonado. Cola oscura con pintas amarillas. Ojos amarillos.

Alcanza un tamaño de 32 a 34 cm.

Hábitat: Habita faldeos, campos y bosques abiertos, bordes de bosques, desde la zona costera hasta la precordillera a unos 2.000 m.s.n.m.

Vuelo típico ondulante. Fácil de identificar dado su diagnóstico grito -del cual su nombre común es la onomatopeya que suele escucharse antes de avistarlo-. Como todos los carpinteros, picotea la corteza de los árboles, generalmente semipodridos, para perforar la madera y nutrirse de las larvas e insectos que captura con su cilíndrica y larga lengua. También picotea los pastizales en busca de su alimento. Nidifica a comienzos de octubre en hoyos en troncos de árboles, barrancos, laderas y cortes de cerro.



Vanellus chilensis (Molina)

CLASE: Aves

ORDEN: Charadriiformes

FAMILIA: Charadriidae



Nombre común: Treile.

Distribución: Desde Copiapó a Chiloé.

Aspecto físico: Frente, garganta y pechos son de color negro intenso con el abdomen blanco. La parte superior posee un color gris-verdoso con brillo metálico. En la nuca sobresalen algunas plumas negras, largas y finas. La cola es blanca con una ancha banda negra. Las patas son relativamente largas y de color rosado. Su pico es de color rojo con punta negra. Ojos rojos.

Alcanza un tamaño de 35 a 37 cm.

Hábitat: Habita las orillas de lagos, lagunas y tranques, campos arados, praderas húmedas y secas, extensiones de pasto en ciudades, hasta los 2.600 m.s.n.m. No entra en bosques o zonas de matorrales altos.

Se mueve por el suelo y nunca se posa en los árboles. Vive solo, en pareja o en pequeñas bandadas. Es agresivo y ruidoso. Su época de reproducción es muy temprana, comenzando a principios de julio. Durante esta época se vuelven muy celosos y agresivos, cuidando la nidada con los polluelos. Ataca a los intrusos, incluidas a las personas, con vuelos en picadas, rasantes y un grito fuerte similar a "tek-tek-tek". Nidifica en el suelo que suele cubrir con algunos pastos secos. Sus crías son autófagas. De colores muy mimetizados con el medio, son difíciles de ver.



Mimus thenca (Molina)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Mimidae

Nombre común: Tenca

Distribución: Desde Copiapó a Puerto Montt.

Aspecto físico: De aspecto estilizado, pico y patas delgadas negras. Cola larga y cuerpo de plumaje especialmente pardo, más oscuro en el dorso. Superciliar blanca. No presenta dimorfismo sexual.

Alcanza un tamaño de 28 a 29 cm.

Hábitat: Zonas de arbustos y matorrales, bordes de bosques, bosques semiabiertos, campos y laderas agrestes; desde la costa hasta unos 2.000 - 2.500 msnm.; hasta 3.500 msnm. hacia el extremo norte de su zona de distribución. También en parques y jardines de las ciudades.

Inicia el vuelo mediante pequeños saltitos que la impulsan para elevarse del suelo. Inconfundible su costumbre de posarse en las ramas más altas de la vegetación, desde donde observa su entorno.

Su alimentación es omnívora. Se alimenta tanto de insectos, arácnidos, lombrices, larvas, como de semillas, frutos y néctares de plantas. Por esto último, muchas veces se ven tencas (y también otras aves) con la cara rojiza o amarilla.



Zenaida auriculata (Des Murs)

CLASE: Aves

ORDEN: Columbiformes

FAMILIA: Columbidae



Nombre común: Tórtola,
Torcaza.

Distribución: Desde Iquique a
Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Es de tamaño intermedio, más pequeña que la paloma doméstica pero más grande que la tortolita cuyana. Su plumaje tiene una coloración general gris-café, con la parte superior de la cabeza más clara y un tono rojizo o vinoso en el pecho. Las patas son rosadas. Muy típico es el ribete blanco en la cola que se descubre al volar. Macho y hembra prácticamente no se diferencian.

Alcanza un tamaño de 26 a 27 cm.

Hábitat: Habita las zonas costeras, valles, campos y bosques hasta los 2.000 m.s.n.m.

Prefiere vivir en grupo. Su vuelo es potente, rápido y recto. Para descansar se posa en árboles y cables de los tendidos eléctricos.

Es un ave de vuelo rápido, con gran capacidad de maniobrabilidad y muy desconfiada, por lo que acercarse a ella en el campo es tarea difícil. Sin embargo, ha ido poblando cada vez mas diferentes ciudades en donde se ha acostumbrado a la presencia humana.

Como ave de caza por excelencia, durante el año son abatidos miles de ejemplares; sin embargo, su gran capacidad de reproducción les permite mantenerse sin problemas y en gran abundancia.



Bubo magellanicus (Lesson)

CLASE: Aves

ORDEN: Strigiformes

FAMILIA: Strigidae



Nombre común: Tucúquere.

Distribución: Arica a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: En general, tonos pardos muy variados de pardo oscuro, negro y ocre. Un penacho en cada zona auricular semejando orejas. Ojos grandes amarillos colocados frontalmente. Collar blanco en la garganta. Pico café oscuro, corto encorvado hacia abajo. Sus dos penachos en la cabeza, similares a orejas, le otorgan la característica principal para reconocerlo.

Alcanza un tamaño de 48 a 50 cm.

Hábitat: Habita principalmente en zonas boscosas y quebradas cordilleranas, también en el valle central y la costa. En el desierto nortino en quebradas aguadas de la cordillera.

Ave de hábitos totalmente nocturnos, su grito rompe el silencio de la noche delatándolo inmediatamente.

Se alimenta principalmente de conejos, ratones, culebras y otros animales que encuentra durante sus vuelos nocturnos aprovechando para ello su excelente sentido de la vista y oído.



Tyto alba (J.E. Grey)

CLASE: Aves

ORDEN: Strigiformes

FAMILIA: Tytonidae



Nombre común: Lechuza, lechuza blanca.

Distribución: Arica a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cara aplanada, borde del disco facial café amarillento con forma de corazón. Pecho y abdomen blanco con algunas plumas cremosas y manchitas oscuras. Alas largas, algo angostas y puntas redondeadas. Alas y cola cruzadas por bandas café amarillento y negruzcas. Patas con dedos emplumados y amarillentos, uñas largas negruzcas. Pico corto, curvo, de color hueso. Ojos negros.

Alcanza un tamaño de 36 a 38 cm.

Hábitat: Habita en Campos y ciudades.

Solitaria o en parejas, posee una gran capacidad de adaptación. Vive y nidifica mismos sitios en los cuales se esconde durante el día; tanto en el campo en algún lugar oscuro, grieta en un muro grueso, árbol hueco o entretecho de las casas de fundos; como en los pueblos y ciudades, siendo tradicional encontrarlas en los campanarios de las iglesias. Sin ser abundante, es bastante común; sin embargo, por sus hábitos nocturnos es difícil poder observarla. Pasa el día durmiendo en su escondite para entrar en actividad al llegar la noche, lanzándose en un vuelo tambaleante y silencioso en busca de su alimento.



Systellura longirostris (Gould)



CLASE: Aves

ORDEN: Caprimulgiformes

FAMILIA: Caprimulgidae

Nombre común: Gallina ciega.

Distribución: sur de Atacama a islas Guaitecas.

Aspecto físico: Cabeza gris plateada manchada de negro; semicollar café rojizo en la nuca; collar blanco en el cuello. Dorso, lomo y cubiertas alares café grisáceas jaspeadas de leonado y negro. Pecho y abdomen oscuros leonado con finas rayas negras transversales. Cola parda con rayas oscuras transversales; rectrices externas con punta blanquecina.

Alcanza un tamaño de 24 a 25 cm.

Hábitat: zonas abiertas, de matorrales y bordes de bosques.

De costumbres nocturnas y crepusculares, muy silenciosa. Durante el día, duerme en el suelo escondida entre alguna planta a ras de suelo o en un sitio oscuro; y si se siente amenazada, levanta un vuelo errático y lento, de malas ganas, lanzando un grito muy suave semejante a "pit - pit - pit", para volver a bajar en forma brusca unos metros más allá. Se alimenta de insectos voladores que caza en el aire, con salidas desde el suelo o desde perchas a baja altura; también los atraídos por luces artificiales. Es a la hora del atardecer cuando entra en actividad su búsqueda de alimento.



Turdus falcklandii (King)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Turdidae



Nombre común: Zorzal.

Distribución: Desde Atacama a Tierra del Fuego. También en Isla Juan Fernández.

Aspecto físico: Cabeza café, corona y nuca oscura, manto, lomo y cubiertas alares café claro. Garganta parda blanquecina con estrías longitudinales oscuras. Pecho y abdomen pardos blanquecinos algo amarillento. Cola negruzca. Pico macizo amarillo. Patas amarillas. Ojos pardos oscuros con párpados amarillos. No existen diferencias externas entre macho y hembra, pero los juveniles tienen un plumaje enteramente moteado.

Alcanza un tamaño 29 cm.

Hábitat: Habita campos, praderas y zonas de cultivo. En jardines, plazas y parques de las ciudades.

Es muy común verlos en planicies con césped corriendo de un lado a otro en busca de alimento, en especial en la zona de sombras. No es muy confiado frente al ser humano. Prefiere moverse entre árboles y arbustos.

Su alimentación consiste principalmente en Lombrices, caracoles y otros animales de cuerpo blando, por lo que es muy común verlos en planicies con césped corriendo de un lado a otro en busca de ellos, en especial en la zona de sombras. También se alimenta de algunos frutos maduros.




Enicognathus leptorhynchus (King)

CLASE: Aves

ORDEN: Psittaciformes

FAMILIA: Psittacidae



Nombre común: Choroy.


Distribución: Aconcagua a Chiloé y rara vez hasta Aysén.

Aspecto físico: Sin dimorfismo sexual. Coloración general verde a verde oscura. Corona con ribetes transversales negros. Mancha rojiza entre la frente y lorums (zona delantera de los ojos). Anillo desnudo rodeando el ojo. Abdomen con mancha rojiza poco notoria. Primarias con barba interna azulina. Cola roja oscura con punta verdosa. Pico gris oscuro, grueso con mandíbula superior larga y ganchuda. Patas rosadas pálidas.

Alcanza un tamaño de 40 a 42 cm.

Hábitat: En bosques esclerófilos hacia la zona central. Hasta los 2.000 m.s.n.m.

Vive únicamente en Chile, eligiendo principalmente los grandes bosques de la zona sur. Muy sociable y bullicioso, suele verse en grandes bandadas durante todo el año, ya sea entre las ramas de los árboles o en el suelo mientras busca su alimento, manteniendo una algarabía a veces increíble. Mientras la bandada come, centinelas ubicados en las ramas vigilan por si algún intruso se les acerca. Posible confusión con la Cachaña (*Enicognathus ferrugineus*), la cual es algo más pequeña y tiene la maxila (mandíbula superior) más corta.



Enicognathus ferrugineus (Chapman)

CLASE: Aves

ORDEN: Psittaciformes

FAMILIA: Psittacidae



Nombre común: Cachaña, caturra.

Distribución: del sur de Valparaíso a Aysén.

Aspecto físico:
Coloración general verde oscura; plumas de la corona y espalda ribeteadas de negro; frente roja. Alas con tonalidades azul metálico. Cola roja oscura. Mancha roja en el centro del abdomen. Pico ganchudo, ancho y corto. Patas cortas con dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás.

Alcanza un tamaño de 34 cm.

Hábitat: Zonas de bosques templados, bosques esclerófilo; áreas adyacentes semi-abiertas; hasta 2.000 m.s.n.m.

Gregario, en bandadas bulliciosas de 20 o más ejemplares. Al presentarse un peligro, toda la bandada levanta vuelo al unísono a la voz de alarma de un vigía. De coloración y forma similar al Choroy, se diferencia de éste por ser notablemente más chico, pico ganchudo y corto y algo menos bulliciosa, aunque en general son de costumbres parecidas.



Milvago chimango (Vieillot)

CLASE: Aves

ORDEN: Falconiformes

FAMILIA: Falconidae



Nombre común: Tiuque.

Distribución: Atacama a Concepción, aunque puede bajar más al sur.

Aspecto físico: Manto y lomo con plumas café canela bordeadas blanquecinas. Garganta, pecho, abdomen y vientre café claro. Cabeza café oscura. Alas café oscuro con franja blanquecina en la mitad basal de las primarias. Cola café claro con franja terminal café oscura. Ojos café.

Alcanza un tamaño de 37 a 40 cm.

Hábitat: Bordes de aguas; lomas; campos, en especial si están recién labrados y a veces en pueblos y ciudades. No sube a la cordillera..

Una de las aves más abundantes de los campos chilenos, en especial en los que han sido arados recientemente debido a su tipo de alimentación. Fácilmente reconocible, ya sea por su grito rasposo o por las bandas pálidas en sus alas al volar, se pueden ver en gran número en el campo. Se alimenta principalmente de insectos, babosas, gusanos o larvas que busca entre las zanjas dejadas por el arado en los campos recién labrados. También peces pequeños, camarones, sapos e incluso carroña de animales muertos o en basurales cerca de las ciudades.



Coragyps atratus (Fraser)

CLASE: Aves

ORDEN: Cathartiformes

FAMILIA: Cathartidae



Nombre común: Jote.

Distribución: Arica a Aysén.

Aspecto físico: Color general negro con brillo metálico por encima. Cabeza y cuello desnudos. Primarias y secundarias grisáceas a blanquecinas por debajo. Pico negro ganchudo. Patas negras.

Alcanza un tamaño de 56 a 74 cm y una envergadura de 133 a 160 cm.

Hábitat: Costas, valles y ciudades de tierras bajas. Suele no subir hacia la cordillera.

Es un carroñero, pero también se alimenta de huevos y animales recién nacidos. En lugares poblados por el hombre se alimenta además en basureros. Encuentra su alimento usando su aguda vista o siguiendo a otros buitres que poseen el sentido del olfato. Al faltarle la siringe órgano vocal de las aves, los únicos sonidos que puede producir son gruñidos o siseos de frecuencia baja. Buen planeador, puede estar bastante tiempo en vuelo sin mover las alas, aprovechando las corrientes de aire.

Se alimenta principalmente carroña. Se alimenta en grupos.



Spinus barbata (Molina)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Fringillidae



Nombre común: Jilguero, canario.

Distribución: Desde el Valle de Copiapó hasta Tierra del Fuego.

Aspecto físico: -Macho: Cabeza amarilla verdosa más oscura hacia la nuca y corona negra. Cuello amarillo verdoso con la parte delantera y garganta negra.

-Hembra: Similar al macho, careciendo de la corona y garganta negras. Partes inferiores menos amarillentas y más verdosas.

Alcanza un tamaño de 13-14 cms

Hábitat: Zonas de matorrales y arboladas.

Se le encuentra desde Atacama hasta Tierra del Fuego, y desde la zona costera hasta los 1.500 msnm., siendo mas abundante en los bosques de la zona sur y migrando en invierno hacia la zona central.

Frecuenta en primavera los campos cultivados, huertos y jardines cercanos de las casas de poblados y fundos, dispersándose en invierno por los valles y llanuras.



Maria Figueira Martin

Sicalis luteola (Meyen)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Thraupidae



Nombre común: Chirigüe.

Distribución: Desde Atacama a Aysén e islas Guaitecas.

Aspecto físico: -Macho: Cabeza gris verdosa hasta las mejillas. Lomo y supracaudales amarillo verdoso. Garganta, cuello, pecho superior y flancos amarillo grisáceo. Pecho y abdomen amarillo. Subcaudales blanquecinas.

-Hembra: similar al macho, partes inferiores más grisáceas y menos amarillas que el macho.

Alcanza un tamaño de 10-12 cms

Hábitat: Campos agrícolas, prados abiertos, praderas al borde de humedales; 0 a 1.500 msnm.

Una de las aves chilenas más abundantes en el país. Se le encuentra desde Atacama hasta Chiloé, Aysén e Islas Guaitecas durante todo el año, hasta una altura de 1.500 msnm.; preferentemente en los campos y prados abiertos.

Se desplazan principalmente volando a bajas alturas. Son granívoros, es decir, su merienda se compone de semillas y brotes que buscan en el suelo. Poseen cantos agradables pero en época reproductiva son suelen vocalizar ruidosamente. El macho realiza vuelos nupciales. Sus parientes en Chile son diversas especies de chirigüe: dorado, cordillerano, verdoso y austral.



Phrygilus patagonicus (Lowe)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Thraupidae



Nombre común: Cometocino patagónico.

Distribución: La Serena a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: -Macho: Cabeza, cuello y parte superior del pecho gris azulado oscuro, similar a un capuchón. Alrededor del pico y lorums negruzco. Dorso amarillo oliváceo con tonos castaños en la mayoría de los ejemplares. Lomo amarillento. Pecho y abdomen amarillo verdoso. Subcaudales gris azuloso pálido. Primarias negruzcas. Cobertoras y cola gris azulado oscuro.

-Hembra: : Cabeza, cobertoras y cola de color grisáceo. Dorso verde oliváceo oscuro. Partes inferiores verde amarillento pálido; subcaudales gris pálido.

Alcanza un tamaño de 15-16 cms

Hábitat: Laderas y quebradas muy vegetadas con arbustos semilleros y salientes rocosas.

Se le encuentra desde la zona costera hasta unos 1.800 msnm., preferentemente desde Curicó hasta Tierra del Fuego en donde nidifica, subiendo hacia la zona central para llegar a la región de Valparaíso, con registros hasta La Serena durante el invierno.

Gusta frecuentar las laderas de quebradas muy vegetadas, especialmente las que tienen arbustos semilleros, o con salientes rocosas cubiertas de matorrales de lianas.



Elaenia albiceps (Hellmayr)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae



Nombre común: Fio-Fio.

Distribución: Visitante y nidificador de primavera y verano (Octubre a Marzo), entre Atacama y Tierra del Fuego. En invierno migra hacia el norte de Sudamérica.

Aspecto físico: Cabeza cenicienta con plumas en la corona algo alargadas y mancha central blanquecina. Por encima gris ceniza con tintes oliváceos. Garganta, cuello y pecho más claro que el dorso. Abdomen blanquecino. Alas negruzcas con ligero tinte oliváceo; secundarias con bordes externos blanquecinos, formando dos bandas transversales blancas. Cola negruzca. Pico y patas negruzcos.

Alcanza un tamaño de 15 cm

Hábitat: plantaciones, Bosques, jardines, huertos,

Ave de tamaño pequeño, es una de las especies más abundantes y mejor conocidas del territorio, encontrándose desde Atacama hasta Tierra del Fuego y a alturas de hasta 2.000 m.s.n.m.. Difícil de ver, ya que le gusta andar entre el follaje de los árboles y arbustos. Sin embargo, su canto característico, un monosílabo algo triste semejante a "fio-fio" o "fiofio-fiofio" lo delata inmediatamente.

Su alimentación es omnívora. Se alimenta principalmente de insectos, aunque también come semillas, bayas y brotes tiernos de árboles frutales.



Anairetes parulus (Klittitz)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae

Nombre común: Cachudito.

Distribución: Paposo a Cochrane (Magallanes).

Aspecto físico: Cabeza negra. Frente, zona auricular y nuca con líneas longitudinales blancas. Dorso gris algo oliváceo. Pecho y abdomen blanquecino con líneas longitudinales negras. Abdomen a veces con tinte amarillento. Alas y cola negruzcas. Barba externa de las rectrices laterales claras. Pico negro. Patas negras. Iris blanco.

Alcanza un tamaño de 11 cm

Hábitat: Valles y laderas semiáridas de la precordillera. Zonas forestales. En invierno puede verse en jardines de ciudades de la zona central.

Es una de las aves más pequeñas de Chile. De movimientos rápidos y agiles, recorre las cortezas de árboles y arbustos o, baja al suelo en busca de su alimento. Suele encontrársele en pequeñas bandadas, separándose por breves períodos durante la época de nidificación. Su alimentación es omnívora, principalmente de insectos, aunque también come semillas.



Scytalopus magellanicus (Gmelin)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Rhinocryptidae

Nombre común: Churrín del sur.

Distribución: Entre la Región del Biobío y la Región de Magallanes.

Aspecto físico: Todo el cuerpo negruzco apizarrado, más oscuro en las partes superiores y más claro en las inferiores. Piernas, subcaudales y primarias con tendencia al pardo oscuro. Pico negro. Patas corneas. Alcanza un tamaño de 11 cm

Hábitat: Prefiere los grandes bosques; también quebradas de matorral denso.

Gusta de las zonas altamente vegetadas, por lo que siente predilección por los grandes bosques del sur, aunque también frecuenta las quebradas tupidas de matorrales. Sigilosa y asustadiza, es difícil verla. Es un pequeño tapaculo, el cual no presenta dimorfismo sexual, por lo que ambos sexos son de color negro apizarrado, con partes laterales y zona de la cloaca más acaneladas. Pico negro, patas de un color rosado apagado y cola corta. Se alimenta principalmente de insectos, que captura moviéndose por el piso, escarbando el suelo con sus patas. Se comporta como un ratón, desplazándose sigilosamente por el suelo entre matorrales densos en bosques húmedos templados.



Pteroptochos tarnii (King)



CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Rhinocryptidae

Nombre común: Hued- hued del sur.


Distribución: Entre la Región del Biobío y la Región de Magallanes.

Aspecto físico: Cabeza apizarrada oscura con frente y corona rojo ladrillo. Cuello y dorso apizarrado oscuro. Lomo con leve tinte rufo, acentuándose más hacia las supracaudales. Pecho rufo castaño; hacia el abdomen rufo suave con rayitas transversales negras finas; flancos y calzones rufo pardusco. Alas con primarias negras y cubiertas apizarradas bordeadas de rufo oscuro. Cola negra. Pico negruzco. Patas negras y grandes..

Alcanza un tamaño de 25 cm

Hábitat: Espesuras de las grandes selvas y bosques.

Ave de característica muy tímida, vive en medio de la espesura de las zonas boscosas, siendo muy difícil verla, incluso después de haber identificado su canto. Tanto es así que para verla, después de haberlo escuchado, hay que quedarse inmóvil por mucho rato para que pueda vérsele aparecer, y huyendo ante el menor asomo de un posible peligro. El tono rufo castaño del pecho puede variar de un ave a otra, siendo en algunos casos más claro y en otros más oscuro. Sin embargo, esta diferencia de tonalidad, debido al tipo de habitat que frecuenta, la típica semi-oscuridad del bosque denso, es muy difícil de notarla.



Xolmis pyrope (Kittlitz)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae



Nombre común: Diucón,
urco.

Distribución: Copiapó a
Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Adultos:
Cabeza, cuello y dorso gris
oscuro. Primarias y
secundarias casi negras,
cobertoras gris oscuras. Cola
gris clara con bordes externos
de las rectrices blancos.
Garganta blanquecina. Pecho
gris claro. Abdomen
blanquecino. Pico negro.
Patas negras. Ojos rojos.

Inmaduros: Gris algo
pardusco. Ojos pardos.

Alcanza un tamaño de 21 cm

Hábitat: Terrenos abiertos
con arbustos o arboles,
jardines y plazas en
ciudades; en la costa, valle
central y precordillera. 0 -
1.500 msnm.

Ave residente desde Tierra del Fuego hasta Aconcagua. Mas al norte llega hasta Atacama durante la época invernal en busca de climas mas templados. A primera vista muy similar a la *Diuca Diuca*, pero mas de cerca se nota el mayor tamaño en general, y en particular la cabeza en relación al cuerpo.

Muy notorio es el ojo de color rojo, que resalta en el tono oscuro de la cabeza. En cambio, en los inmaduros son de color pardo. Se alimenta principalmente de insectos; también frutos silvestres.



Theristicus melanopis (Gmelin)

CLASE: Aves

ORDEN: Pelecaniformes

FAMILIA: Threskiornithidae



Nombre común: Bandurria.

Distribución: Antofagasta a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza y cuello amarillento ocráceo con corona y nuca más oscuras. Pecho blanquecino separado del cuello por una línea gris. Lados del pecho y abdomen negros. Dorso pardo grisáceo. Cubiertas alares menores y medianas blancas con bordes grises oscuros; las mayores blanco grisáceas. Primarias negras. Ojos, lorums y garganta desnuda de color negro. Pico largo curvado hacia abajo, negro la mitad basal y córneo el resto; carúncula negra bajo el pico. Iris y patas rojas a rosadas.

Alcanza un tamaño de 73 cm

Hábitat: Zonas pantanosas y orillas de lagos y lagunas. También en campos arados y sembrados.

Aunque su zona de distribución va desde Antofagasta a Tierra del Fuego, es un ave rara en su rango norte y centro, y bastante común entre Concepción (VIII° Región) y el sur de la X Región, siendo una especie migratoria de invierno hacia la parte norte; y migratoria de verano hacia la parte sur de su zona de distribución.

Se alimenta de sapos, renacuajos, lombrices, insectos y otros animales semejantes a orillas de lagos, lagunas o embalses. También en campos arados y sembrados, en donde es fácil encontrar alguna pequeña bandada alimentándose.



Pygarrhichas albogularis (King)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Furnariidae



Nombre común: Comesebo, carpintero pardo.

Distribución: Valparaíso a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza, cuello trasero y dorso café oscuro. Lomo, supracaudales y cola rufos. Garganta, cuello y pecho blancos. Abdomen con plumas blancas bordeadas de pardo oscuro, predominando más el blanco en la línea media. Alas café oscuro con cubiertas y secundarias bordeadas de rufo. Rectrices sin barbas en las puntas las que quedan como unas prolongaciones espinosas. Pico ligeramente encorvado hacia arriba.

Alcanza un tamaño de 16 cm

Hábitat: Zonas boscosas y sus bordes. 0 - 1200 msnm.

Gusta de los bosques viejos, frecuentando también los bordes y claros de éstos. A pesar de tener costumbres similares a los Carpinteros, no poseen fuertes músculos en el cuello. Debido a esto es que debe hacer sus nidos en maderas de troncos podridos o semiquemados.

Difícil de ver por su pequeño tamaño, timidez y colores mimetizados con su entorno.

Levanta con su pico la corteza, arrancando pedacitos y líquenes en busca de su alimento. También frequenta los restos de fogatas de algún excursionista o en zonas de camping en busca de grasa.

Se alimenta de pequeños insectos y larvas.



Ceryle torquata (Meyen)



CLASE: Aves

ORDEN: Coraciiformes

FAMILIA: Alcedinidae

Nombre común: Martín pescador.

Distribución: Concepción a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Macho: Cabeza grande azul grisácea, plumas de la corona con centro negro y algo levantadas. Plumaz del dorso azul grisáceas con finas rayas negras y moteadas de blanco. Garganta y lados del cuello blanco. Pecho, abdomen, subcaudales, subalares y axilares rufo intenso. Cola negruzca con bandas transversales blancas. Pico negro puntiagudo. Hembra: se diferencia del macho porque tiene el pecho azul grisáceo, sin teñido de rufo; y abdomen rufo, separados por una línea blanca.

Alcanza un tamaño entre 43 a 45 cm

Hábitat: Lagos, lagunas, tranques, esteros, ríos, bahías marinas; en general aguas tranquilas y claras rodeadas de arboles.

Ave de la zona sur de Chile, generalmente se le encuentra en ramas de arboles al borde de ríos y lagos, pero sin que menosprecie el agua salada de zonas marinas como estuarios, canales y bahías de las numerosas islas de ese sector.

Muy fácil de identificar por su tamaño y colores. Permanece inmóvil posado sobre una rama o tronco al borde del agua esperando a que algún pez se acerque a la superficie para lanzarse de cabeza sobre él y capturarlo con su gran pico. Al emerger vuelve a posarse en la rama.

Se alimenta principalmente peces de hasta 20 cms. También ranas, insectos, cangrejos.




Carla Jiménez

Tachycineta meyenii (Meyen)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Hirundinidae



Nombre común: Golondrina

Distribución: Atacama a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Partes superiores de la cabeza, cuello trasero, dorso y lomo de color negro con brillos metálicos azulinos. Garganta, cuello delantero, pecho, abdomen y rabadilla blancos. Alas y cola negras con algo de brillo metálico verdoso. Pico negro pequeño. Patas negras. Alcanza un tamaño de 13-14 cm

Hábitat: Campo y ciudades

Especie abundante en su zona de distribución que abarca desde el extremo sur hasta Atacama, y desde la zona costera hasta la precordillera. En la zona de Magallanes es ave migratoria de verano.

Se alimenta de insectos que captura al vuelo.

Una característica de esta ave es que se encuentra muy a gusto viviendo en las ciudades o en zonas pobladas, y anidando en aleros y techumbres de casas o agujeros de muros.



Scelorchilus rubecula (Kittlitz)

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Rhinocryptidae



Nombre común: Chucao, tricao.

Distribución: Del sur de Colchagua a Aysén.

Aspecto físico: Cabeza gris apizarrada. Manto y lomo gris-rojizo. Garganta y pecho superior rufo. Pecho gris con líneas transversales finas blancas y negras. Abdomen gris. Cola rufa con negro. Pico negro. Patas negras.

Alcanza un tamaño de 18 cm

Hábitat: bosques y selvas de la zona sur.

Gusta mantenerse dentro de las espesuras de los bosques, generalmente a nivel de suelo saltando entre palos y ramas, en las cercanías de algún estero o riachuelo.

El dorso pardusco, abdomen con rayas irregulares de blanco y negro y el tono rojo ladrillo de su garganta y pecho hacen fácil de reconocer aunque en las sombras del bosque es posible confundirlo con el Hued-hued, que es un poco mas grande y de coloración distinta.



Chloephaga picta (Gmelin)



CLASE: Aves

ORDEN: Anseriformes

FAMILIA: Anatidae

Nombre común: Caiquén.

Distribución: Talca a Tierra del Fuego. Abundante desde Aysén al sur. Hacia el norte hasta Colchagua como visitante de invierno. Registros de nidificación en la cordillera de Santiago.

Aspecto físico: Macho: Cabeza y cuello superior blancos. Cuello inferior, pecho, abdomen y flancos de color blanco con barras gruesas negras. Lomo, escapulares y primarias gris oscuro. Secundarias blancas. Plumas centrales de la cola grises oscuras y las laterales blancas. Pico negro. Patas negras.

Hembra: Cabeza y cuello rojo ladrillo. Dorso y pecho rufo con barras negras. Abdómen y flancos inferiores blancos con barras gruesas negras. Lomo y supracaudales negras. Alas igual al macho. Pico negro. Patas amarillas.

Alcanza un tamaño de 60 a 66 cm

Hábitat: Llanuras y planicies abiertas con pasto

Gregario, defensivo y territorial: sin duda la presencia del Caiquén (o Ganso Magallánico, *Chloephaga picta*) se hace notar al sur del continente Sudamericano. Es el mas abundante de los gansos en la zona de Magallanes y Aysén.

Encontrándose principalmente en pastizales abiertos, estas aves diurnas comen más que nada pastos con frutos del bosque, semillas y algas verdes como suplemento alimenticio. A pesar de que a los Caiquenes les gustan más los pastos cortos para pastar, estas aves generalmente tienen a sus crías en lugares con vegetación más densa para poder mantener el nido escondido.



Chloephaga poliocephala (Sclater)



CLASE: Aves

ORDEN: Anseriformes

FAMILIA: Anatidae

Nombre común: Canquén.

Distribución: Colchagua a Magallanes.

Aspecto físico: Sexos iguales. Cabeza y cuello grises. Pecho, sus lados y manto café rojizo. Dorso y cubiertas mayores del ala gris pardo. Flancos blancos con líneas transversales negras. Abdomen blanco adelante y acanelado atrás. Cubiertas medianas y menores blancas. Pico grisáceo a negro. Patas negras por delante, amarillo-anaranjado por detrás.

Alcanza un tamaño de 50 a 60 cm

Hábitat: Praderas de pastos cortos, orillas de ríos y lagos, costas y bosques poco densos.

Gran parte del año llevan una vida gregaria, frecuentando los terrenos bajos con pasto y pantanosos, orillas de ríos, lagunas y estuarios. Se distingue fácilmente por su cabeza y cuello grises, su pecho rojizo y sus flancos blancos listados con negro. Se alimenta de vegetales y plantas acuáticas.



Fulica armillata

(Vieillot)

CLASE: Aves

ORDEN: Gruiformes

FAMILIA: Rallidae



Nombre común: Tagua.


Distribución: Coquimbo a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza y cuello negros. Resto del cuerpo negro apizarrado, algo mas claro en las partes inferiores. Doblez del ala y borde externo de las primarias blancos. Escudo frontal y pico amarillo con manchas rojas en la unión de ambos. Patas oliváceas con manchas amarillas y franjas rojas en la tibia; dedos lobados grandes. Ojos rojos.

Alcanza un tamaño de 55 cm.

Hábitat: Lagunas, lagos, lugares de aguas calmas y vegetación en las orillas. No sube a la zona cordillerana.

Presente en casi todos los lagos, lagunas y ríos de aguas tranquilas en su zona de distribución. Es la más conocida y abundante de las especies de tagua que se encuentran en el país. Algo difícil distinguirla a lo lejos con la tagua chica (*Fulica leucoptera*) y la tagua de frente roja (*Fulica rufifrons*), ya que con frecuencia suelen encontrarse juntas. La mejor forma de hacerlo es fijándose en la forma y colores del pico y escudo frontal, aunque visualizar estos detalles en el hábitat es tarea bastante difícil si no se cuenta con binoculares.



Pardirallus sanguinolentus (Hellamyr)

CLASE: Aves

ORDEN: Gruiformes

FAMILIA: Rallidae



Nombre común: Pidén, cotuta.

Distribución: Atacama a Aysén.

Aspecto físico: Cara, cuello, pecho y abdomen gris ceniciente. Pico largo, algo curvado, con rojo en la base, azulado en el medio y verdoso en el extremo. Patas rojas en la época reproductiva y verdosas durante el resto del año. Ojos rojos. Alcanza un tamaño de 55 cm.

Hábitat: Zonas con bastante vegetación a orillas de lagos, lagunas, pantanos, esteros, ríos.

Ave de riberas y zonas pantanosas. Muy tímida durante el día, rara vez se aleja de los matorrales espesos, ocultándose a la menor inquietud. En la noche, suele alejarse de estos para buscar su alimento en campos abiertos o cultivados. Normalmente se desplaza caminando; vuela ocasionalmente solo al verse acorralada. A pesar de ser un ave de ambientes acuáticos, muy rara vez se le ve nadar.



Nycticorax nycticorax (Bonaparte)



CLASE: Aves

ORDEN: Pelecaniformes

FAMILIA: Ardeidae

Nombre común: Huairavo,
bruja, huadra.

Distribución: Atacama a
Tierra del Fuego, con
desplazamientos hacia el
norte.

Aspecto físico: : Cabeza
negruzca con azul
tornasolado. Frente y
superciliares blancas. Dos o
tres plumas largas blancas
que salen desde la cabeza
hacia atrás. Dorso y lomo
negruzcos con brillos
tornasolados azules y verdes.
Garganta blanca. Pecho y
abdomen grisáceo claro y
alas grises mas oscuras. Pico
grueso oscuro. Patas
amarillas. Ojos rojos.

Alcanza un tamaño de 55 cm

Hábitat: Bordes de lagos,
vegas, esteros y lugares de
aguas de nivel bajo. También
en la zona costera.
Predominio hacia tierras
bajas.

Se le encuentra por lo general en
tierras bajas de todo el país, más
comúnmente de Atacama al sur.
Es un ave oportunista, de dieta
variada. Peces, anfibios,
crustáceos, insectos, lagartijas,
lombrices; los que caza
manteniéndose inmóvil en aguas
de zonas bajas, mirándola
fijamente hasta descubrirlo, para
atraparlo con un picotazo certero
y comiéndoselo de inmediato.




Gallinago paraguaiae (Vieillot)

CLASE: Aves

ORDEN: Charadriiformes

FAMILIA: Scolopacidae



Nombre común: Becacina,
porotera

Distribución: Atacama al
Cabo de Hornos

Aspecto físico: Cabeza parda
con líneas claras que salen de
la base del pico hacia la
nuca; una sobre el ojo y otra
bajo el ojo. Espalda
manchada con tonos negros,
café amarillento y marrón.
Flancos blancos con líneas
transversales negruzcas.
Abdomen blanco. Pico recto,
largo de color verdoso
oscuro. Patas amarillo
verdosas.

Alcanza un tamaño de 32 cm

Hábitat: Zonas pantanosas,
vegas, bofedales, bordes de
aguas calmas.

Durante la época de reproducción
o en ciertas actitudes
territoriales realiza un vuelo muy
típico, que consiste en tomar
altura, volar en círculos y luego
lanzarse en picada desde unos 10
mts., produciendo un sonido muy
característico. Esto lo logra al
separar las rectrices externas de
la cola, las que con la fricción del
aire producen un zumbido
inconfundible.

Se alimenta de insectos, larvas y
lombrices que busca enterrando
su largo pico en el barro.



Chroicocephalus maculipennis (Lichtenstein)

CLASE: Aves

ORDEN: Charadriiformes

FAMILIA: Larinae



Nombre común: Cahui, gaviotín.

Distribución: Arica a Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza y garganta pardas oscuras con semicírculo blanco en la parte trasera del ojo. Cuello, pecho y abdomen blancos. Dorso y cobertoras grises. Primarias blancas, algunas con punta negra. Secundarias grises. Superficie alar interna blanca. Pico rojo oscuro. Patas rojas oscuras. En época de reposo: cabeza y garganta cambian a blanco con nuca grisácea; mancha oscura en la zona auricular.

Alcanza un tamaño de 42 cm

Hábitat: Costas, lagos, campos agrícolas, pantanos, desagües de aguas residuales.

Se distribuye a lo largo de todo Chile, preferentemente durante el verano en la zona centro - sur, migrando en invierno hacia el norte del país. También se le encuentra en Argentina, islas de los Estados y Falkland (Malvinas); hasta Alagoas (Brasil), por el lado Atlántico; es decir, esta presente en todo el cono sur de Sudamérica.

Se alimenta de insectos, lombrices, crustáceos, peces; desperdicios humanos. Alimento preferido en época de cría son los peces.





Mamíferos, Anfibios y Reptiles

Rhinella spinulosa (Wiegmann)

CLASE: Anfibios

ORDEN: Anura

FAMILIA: Bufonidae



Nombre común: Sapo espinoso.

Distribución: Los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Chile se encuentra desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

Aspecto físico: Animal grande, de entre 4,5 y 10 cm de longitud, piel muy áspera debido a granulaciones con espinas cónicas, grandes glándulas parótidas; diseño dorsal muy poco evidente, miembros proporcionados.

Hábitat: Es una especie de hábitos principalmente terrestres, que habita cerca de ríos, vertientes, lagunas y vegas de altura.

Se encuentra en toda la región altoandina hasta alturas cercanas a los 5.000 msnm. Son nocturnos y salen durante el día solo en ocasiones de lluvia y de cielos nublados. En invierno se esconden bajo las piedras. Los huevos son puestos en cintas de miles de huevos de color negruzco, rodeados de material gelatinoso, que se depositan en las orillas de ríos, lagunas y vegas. Las larvas son de color negro y miden hasta 35 mm.



Batrachyla leptopus (Bell)



CLASE: Anfibios

ORDEN: Anura

FAMILIA: Ceratophryidae

Nombre común: Rana moteada.

Distribución: Su distribución es desde Concepción, Región del Bío-Bío, hasta la Región de Aysén.

Aspecto físico: Rana pequeña, de entre 23-35mm de longitud hocico-cloaca, tiene el cuerpo esbelto y las extremidades delgadas, con dedos finos y de puntas ensanchadas. Los dedos son libres y la membrana interdigital es muy reducida. La cabeza y el hocico son redondeados y la piel es suavemente granulosa. La región ventral es de color crema, con manchas oscuras irregulares y difuminadas de extensión variable. Las extremidades presentan bandas oscuras.

Hábitat: Es un anfibio de actividad nocturna y con buena capacidad trepadora, por lo que es común observarlo sobre arbustos, se refugia en cavidades y troncos.

Su piel es suavemente granulosa y de una coloración dorsal variable, con manchas irregulares grises, terracotas, verdosas o café oscuras sobre un fondo más claro. Es una ranita muy trepadora por lo que no es raro observarla sobre los arbustos. Se trata de una especie donde el macho posee cuidado parental, ya que se queda cerca de la postura, compuesta por unos 70 a 200 huevos depositados por las hembras en zonas inundadas o pozas bajo rocas o troncos caídos.



Lycalopex culpaeus (Molina)

CLASE: Mammalia
ORDEN: Carnivora
FAMILIA: Canidae



Nombre común: Zorro culpeo, zorro colorado, zorro rojo.

Distribución: Ocupa desde el sur de Colombia toda la región andina hasta Tierra del Fuego.

Aspecto físico: El pelaje de la cabeza y orejas es rojizo, hocico puntiagudo y alargado con la mandíbula blanca grisácea, más oscura hacia el final. Las patas son rojizo ámbar y los pies más claros, casi blanquecinos, con cinco dedos. 1 a 1,2 m., de los cuales 35 a 45 cm. corresponden a la cola.

Hábitat: habita lugares abiertos. Los ambientes que más frecuenta son los pastizales. Hasta los 4500 m.s.n.m.

Presenta hábitos crepusculares, aunque la mayoría de sus presas las captura en la noche. Es un cazador solitario y oportunista. Ambos padres se turnan para alimentar a la camada que puede alcanzar hasta 8 ejemplares. El apareamiento ocurre entre agosto y octubre y las crías tienen una gestación de unos 60 días aproximadamente.

Es de hábitos solitarios, aunque en algunos casos comparte su territorio con la hembra. Es mayormente nocturno en donde hay cercana presencia humana, de lo contrario se lo observa también en el crepúsculo y durante la mañana.



Lycalopex griseus (Gray)

CLASE: Mammalia
ORDEN: Carnivora
FAMILIA: Canidae



Nombre común: Zorro chilla, Zorro.

Distribución: El Zorro chilla se distribuye a lo largo de todo Chile, habitando una gran cantidad de hábitats.

Aspecto físico: El color general del pelaje es grisáceo, con zonas de color amarillento, como en la cabeza, la cual además está orlada de blanco, y las patas. La barbilla y la punta de la cola exhiben sendas manchas negras, en tanto que los muslos y el dorso de la cola presentan una banda de ese mismo color. La región ventral es blanquecina. La forma del hocico es puntiaguda. Las orejas son grandes y la cola es larga y de pelaje denso.

Hábitat: habita lugares abierto. Frecuenta pastizales hasta los 4500 m.s.n.m.

Es un pequeño cánido exclusivamente sudamericano. Su distribución geográfica ocupa una franja a ambos lados de la Cordillera de los Andes y abarca fundamentalmente Argentina, Chile y Uruguay. Se les puede ver llegando incluso a las playas (carretera austral), hasta los bosques templados húmedos lluviosos de la cordillera.

Son muy pequeños, curiosos y se acercan bastante cuando están acostumbrados a las personas.

Tienen una alimentación omnívora, por lo que cuando dejan de alimentarse del entorno, se genera un desequilibrio en la cadena trófica, con aumento de algunas especies que son controladas por estos depredadores.



Lagidium viscacia (Molina)

CLASE: Mammalia

ORDEN: Rodentia

FAMILIA: Chinchillidae



Nombre común: Vizcacha, chinchilla.

Distribución: Distribución en Chile discontinua. Registrada en 17 localidades. Entre los 600 y 5.000 msnm

Aspecto físico: Cola con largos pelos en el dorso. Pelaje suave y fino que cambia parcial y permanentemente durante el año. Su coloración no es uniforme y está condicionada por los mechones de pelo recién emergidos, pelo asentado y pelo viejo. Pese a esto, se define una tonalidad genérica gris, con algunos pigmentos que van del amarillento al negro.

Hábitat: Presente en diversos hábitats. En terrenos escarpados y rocosos

Gregario, de actividad diurna, preferentemente matinal y crepuscular, conforma grupos que varían desde Página 2 de 6 dos a varios cientos de individuos. Sus refugios carecen de elementos de aislación térmica. Al parecer no hiberna, pero emigra a menor altitud cuando el clima se torna inclemente. Carece de apófisis espinosas cervicales, lo cual es útil frente a la cerrada flexura del cuello, que tiende a acortar este segmento, en favor de la estabilidad durante el salto.

En estado de alarma emiten silbidos penetrantes que alertan, no sólo a la colonia, sino que a vicuñas y otros roedores.



Myocastor coypus (Molina)

CLASE: Mammalia

ORDEN: Rodentia

FAMILIA: Myocastoridae



Nombre común: Coipo.

Distribución: Habita desde Elqui (IV Región) a Malleco (IX Región), desde el nivel del mar hasta 1.100 m de altitud.

Aspecto físico: El coipo mide unos 40 a 60 cms. de largo, mas unos 30 a 45 cms. de cola, y pesando entre 5 y 9 kg. Es acuático como el castor, pero a diferencia de éste no tiene una cola con forma de remo, sino larga y redondeada como la de un ratón. Su pelo es sedoso, delgado, tupido y largo, de color café-acanelado.

Hábitat: Habita en agua dulce: pantanos, vegas, ríos en zonas planas, lagunas, a orillas de lagos y humedales, siempre donde hay mucha vegetación acuática emergente como la totora

Nocturno-crepuscular. Organización social de tipo colonial y jerárquica, con grupos de 2 a 13 individuos, los adultos suelen ser solitarios. La actividad diaria tiene un máximo en octubre y un mínimo en febrero. Construye refugios subterráneos para protección y crianza, con entradas subacuáticas, labrando el terreno con dientes y garras en barrancos solitarios y riberas con cubierta vegetal densa. Utiliza secreciones de sus glándulas perianales para marcar su ámbito de hogar. Construye, además, plataformas con todo tipo de vegetales, llegando a formar verdaderos islotes flotantes, utilizados para alimentarse y descansar.



Dromiciops gliroides

(Thomas)

CR



CLASE: Mammalia

ORDEN: Microbiotheria

FAMILIA: Microbiotheriidae

Nombre común: Monito del monte.

Distribución: Se encuentra entre la región del Maule y la región de los Lagos y desde Río Claro hasta Chiloé, desde el nivel del mar hasta los 2.000 msnm.

Aspecto físico: Única especie viviente de este orden. Mide entre 19,5 y 25 cm de largo y pesa aproximadamente entre 15 y 32 g. Su pelaje es denso y pardo dorsalmente, con manchas blancas a los lados del cuerpo y vientre de color blanco. Las orejas son pequeñas con pelos cortos y sus ojos están rodeados por pelaje oscuro. Su cola es prensil y está cubierta de pelos. Sus extremidades posteriores presentan pulgar oponible. Las hembras son más grandes que los machos y presentan un marsupio pequeño, aunque bien desarrollado, con cuatro mamas.

Hábitat: endémico de los bosques templados y húmedos chilenos. Habita bosques ricos en especies como la caña colihue o la quila, comunidades arbustivas de mirtáceas con especies como arrayán o algunas otras especies arbustivas como el michay.

De comportamiento crepuscular y nocturno. Dadas las características de su anatomía, se describe como una especie arbórea. Construyen nidos musgosos en troncos caídos y árboles, a no más de 3 metros de altura. Alcanzan la madurez sexual a los 2 años de vida.

Se alimenta especialmente de insectos (alimentación insectívora), aunque durante el otoño también come frutos silvestres para acumular reservas en su cola, y así poder dormir todo el invierno, cuando escasea el alimento. Sus depredadores principales son el zorro chilla y el Concón.



Galictis cuja (Molina)

CLASE: Mammalia

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Mustelidae



Nombre común: El Quique, Hurón Chileno.

Distribución: Se encuentra desde Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y desde Coquimbo a Magallanes, desde los 0 a los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Aspecto físico: Zorrillo de cuerpo alargado, cola corta, con patas muy cortas. Su coloración es amarilla o gris mezclado con negro. La parte inferior, patas y nariz es negra. Con una franja blanca que atraviesa la cabeza y el cuello.

Alcanza un tamaño de 44 a 76 cm.

Hábitat: Habita en llanuras, zonas semipantanosas y quebradas alrededor de corrientes de agua, desde el nivel del mar hasta los 3.800 m.s.n.m.

Muy agresivo. Son muy rápidos, ágiles y se trasladan en fila. Es un excelente cavador, construye galerías de hasta cuatro metros. Posee una forma parecida a un hurón y tal como el zorrillo, tiene glándulas alrededor del ano que producen líquido fétido. De hábitos principalmente nocturno y solitarios, aunque se les puede observar en pequeños grupos familiares. Son muy rápidos, ágiles y se trasladan en fila. Posiblemente es monógamo. Tiene un rol muy valioso como depredador del ratón de cola larga (transmisor del virus Hanta) y eliminador plagas de ratas, conejos, insectos y aves introducidas.



Puma concolor (Linnaeus)

CLASE: Mammalia

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Felidae



Nombre común: Puma.

Distribución: El puma se encuentra a lo largo de todo Chile, desde la región de Arica y Parinacota, hasta la Patagonia, en donde se encuentran los ejemplares más grandes del país.

Aspecto físico: Posee una coloración general uniforme en todo el cuerpo, con un pelaje que varía desde tonalidades de grises hasta pardo rojizo, destacando la coloración blanquecina alrededor de la boca.

Generalmente no sobrepasan los 35 a 40 kg de peso y 1,5 m de longitud total, mientras que en Aysén y Magallanes se han capturado individuos de poco más de 100 kg y casi 2,5 m de longitud.

Hábitat: Habita en llanuras, zonas semipantanosas y quebradas alrededor de corrientes de agua, desde el nivel del mar hasta los 3.800 m.s.n.m.

El puma (*Puma concolor*) es el carnívoro terrestre más grande que habita en Chile, aunque su tamaño y peso varía según la subespecie y área geográfica, siendo en general más grandes los animales del altiplano y especialmente los del extremo sur. El puma es generalista, teniendo una dieta muy diversa según el sector geográfico en donde se ubique. Consume preferentemente mamíferos terrestres (desde grandes cérvidos y camélidos, hasta diminutos roedores). Es más hábil para escalar y aunque no es muy afecto a nadar, puede realizarlo sin problema. Este animal no puede rugir a diferencia de los grandes felinos. En vez de eso, emite silbidos agudos y ronroneos como un gato doméstico. Igualmente realiza gritos que son confundidos con otros animales.



Leopardus guigna (Molina)

CLASE: Mammalia
ORDEN: Carnivora
FAMILIA: Felidae



Nombre común: Güiña.

Distribución: Se le puede encontrar desde Coquimbo (IV región) hasta Aisén (XI región) incluyendo la isla de Chiloé y las Guaitecas, desde el nivel del mar hasta el límite de la vegetación.

Aspecto físico: Su pelaje es generalmente amarillento o marrón grisáceo, cubierto de manchas oscuras y redondeadas, y franjas negruzcas en su cuerpo; rayitas rubias se presentan en la cabeza y los hombros, y una serie de anillos negros en la cola. También existen guiñas negras, las que se dan más hacia el sur.

Hábitat: Vive especialmente en bosques esclerófilos templados mixtos, como la selva valdiviana.

Las madres suelen tener entre uno y cuatro cachorros. Su período de gestación es de 75 días y su longevidad es de 15 años. Cazador nocturno, de hábitos arborícolas, sus presas son pequeños roedores (arborícolas preferentemente), pequeños marsupiales, perdices, palomas, insectos, e incluso pudués. Utiliza los árboles como guaridas. Sus enemigos naturales son el puma y el zorro colorado.

Es uno de los felinos de menor tamaño de América, como un gato doméstico pequeño pues alcanza hasta 45 cm de longitud y 20 cm de cola.



Pudu pudu (Molina)

CLASE: Mammalia

ORDEN: Artiodactyla

FAMILIA: Cervidae



Nombre común: Puma.

Distribución: La especie vive sólo en Argentina y Chile

En Chile se ubica en sectores cordilleranos y precordilleranos de Los Andes y de la Costa, desde Curicó hasta Aysén.

Aspecto físico: El pudú es el más pequeño de los ciervos de América. Su tamaño es de 40 cms. de altura y su peso es de aproximadamente 10 kgs. Su color varía de café rojizo a grisáceo amarillento, siendo el primero el más común.

Generalmente no sobrepasan los 35 a 40 kg de peso y 1,5 m de longitud total.

Hábitat: Habita en ambientes con abundante vegetación, especialmente bosques con sotobosque (vegetación baja) que le brinde condiciones adecuadas para ocultarse.

Es en general un animal tímido y huidizo, que se oculta entre la vegetación, y que vive en forma solitaria o grupos de no más de tres individuos, siendo común encontrarlo en parejas.

Evita los lugares abiertos, haciendo uso de ellos sólo en claros dentro del bosque o sitios cercanos a la vegetación arbórea. Especie confinada a los bosques templados Valdivianos, desde el nivel del mar a los 1.700 m de altura. Se asocia preferentemente a lugares sombríos y húmedos del sotobosque



Liolaemus tenuis (Molina)

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae



Nombre común: Lagartija esbelta, lagartija de colores.


Distribución: Desde Coquimbo a la Región de Los Lagos.

Aspecto físico: Macho con abundantes manchitas amarillas y verdes en la mitad anterior y calípsos en la mitad posterior. El abdomen es blanco grisáceo. Hembra presenta un aspecto más fino y la cabeza de color gris amarillenta. Cabeza gris oscura con manchitas amarillas que llegan hasta el hocico.


Las hembras miden unos 12 cm. y los machos unos 14 cm.

Hábitat: Sus hábitats preferenciales son arborícolas, sin embargo, también se adapta a construcciones humanas que presentan perchas, como son las murallas.

La Lagartija Esbelta como se le conoce comúnmente se ha adaptado en forma exitosa al avance del hombre, por lo que es normal verla cerca de asentamientos humanos. Una coloración acentuada y llamativa caracteriza a los machos, las hembras por su parte son menos vistosas. Esta especie normalmente es de hábitos arborícolas, donde el macho suele apoderarse de un árbol, y comparte su territorio con otras hembras, los machos son bastante territoriales, por lo que no aceptan la presencia de otros machos, incluso pueden llegar a la agresión, dándose fuertes mordidas con el fin de ver cuál es el más fuerte.



Phymaturus palluma (Molina)



CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae

Nombre común: Matuasto.

Distribución: Desde la IV a la VIII Región. En la zona austral se ha descrito una raza geográfica. En Ñuble está presente en ambientes rocosos de la Cordillera de los Andes

Aspecto físico: Corresponde a un lagarto robusto, aplastado dorsoventralmente. Para huir de los depredadores puede expandir su cuerpo hacia los lados y así poder meterse entre las rocas. Su coloración es negra con tonos grises y verdes oscuros (hembras) o verdes brillantes y amarillos fosforescentes (machos)

Longitud de 15 a 20 cms.

Hábitat: Habita en los roqueríos sobre los 1.800 m.s.n.m. de la Cordillera de los Andes.

Existe una gran cantidad de especies reptiles llamadas comúnmente Matuasto, todas ellas del género *Phymaturus*.

Es precisamente su cuerpo aplastado dorsoventralmente, rechoncho, el que le permite, al sentirse en peligro, afirmarse entre las rocas en donde vive, expandiéndolo por el tiempo que sea necesario si alguien pretende alcanzarlo entremedio de lo estrecho de su hogar.

Presenta un dimorfismo sexual en que el macho se diferencia de la hembra especialmente por ser de piel intensamente colorida, característica que no lo complica ya que ésta se asemeja a las rocas recubiertas por líquenes que existen en su hábitat.



Philodryas chamissonis (Wiegmann)

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Colubridae



Nombre común: Culebra de cola larga.

Distribución: Desde Paposo, región de Antofagasta hasta Valdivia en la Región de Los Ríos.

Aspecto físico: Culebra que posee una cabeza alargada con el hocico ligeramente romo. Es de color generalmente amarillo ocre. Detrás de la cabeza el dorso es recorrido por una banda ancha, de color café oscuro que ocupa el ancho de tres a cinco escamas, que se continúa sobre la cola. Es la culebra más abundante y presenta la más amplia distribución en Chile.

Longitud de 100 a 150 cms.

Hábitat: Habita desde la costa hasta la precordillera de los Andes (600 msnm.)

Es la culebra más grande de Chile. Agresiva y muy activa, se mueve fácilmente entre los matorrales, principalmente terrícola, vive en pastizales y zonas rocosas, es común verla en los caminos del Panul en un día soleado de verano. Caza pequeños vertebrados como aves, lagartijas y roedores, matándolos por constricción. Aunque venenosa, su veneno proviene de los dientes posteriores y no los usa para matar sino para digerir más rápido a la presa. El veneno contiene un anticoagulante que produce sangramiento prolongado pero no es realmente una amenaza para el ser humano ya que la Culebra arrancará antes que atacar a una persona.



Tachymenis chilensis (Schlegel)

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Colubridae



Nombre común: Culebra de cola corta.

Distribución: Desde la Región de Antofagasta (Paposo) hasta la Región de Los Lagos (Chiloé), donde ha sido registrado hasta una altitud levemente superior a los 3.500 msnm.

Aspecto físico: La cola representa aproximadamente un sexto de la longitud total. Color general del cuerpo café grisáceo. Presenta una banda dorsal de color grisáceo claro, rodeada a ambos lados por dos bandas negras paravertebrales, que se extienden hasta la cola. Por fuera de estas bandas se sitúan las bandas amarillentas limitadas inferiormente por una línea negra. Toda la región ventral es amarillenta blanquecina.

No sobrepasa los 70 cms de largo.

Hábitat: Cercanías de cuerpos de agua, matorrales, laderas o en ambientes fríos y húmedos.

Posee una conducta tímida y poco agresiva, no existiendo antecedentes de muerte por su mordedura, ya que los síntomas son locales.

Carnívora, se alimenta principalmente de lagartijas. A pesar de su pequeño tamaño es más agresiva que la de Cola Larga y su veneno también es más fuerte, contiene una neurotoxina que afecta el sistema nervioso, sin embargo al igual que la otra Culebra, el veneno proviene de dientes al fondo del paladar y pocas veces lo inocula. No es un real peligro para el ser humano ya que prefiere huir. Vivipara, la hembra da a luz hasta 8 culebrillas.



Liolaemus zabalai

(TRONCOSO-PALACIOS, DÍAZ, ESQUERRÉ & URRA,
2015)



CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae

Nombre común: Lagarto.

Distribución: Endémico del Parque Nacional Laguna del Laja.

Aspecto físico: No descrito.

Longitud de cercana a 7 cm a 10 cm.


Hábitat: Escoria volcánica del Parque Nacional Laguna del Laja

No descrita



Liolaemus scorialis

(TRONCOSO-PALACIOS, DÍAZ, ESQUERRÉ & URRA,
2015)



CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae

Nombre común: Lagarto.

No descrita

Distribución: Endémico del Parque Nacional Laguna del Laja.

Aspecto físico: No descrito.

Longitud de cercana a 7 cm a 11 cm.

Hábitat: Escoria volcánica del Parque Nacional Laguna del Laja



Hongos comestibles de Antuco.

En Antuco existe una gran variedad de hongos silvestres comestibles, en este libro sólo estarán las especies de fácil identificación

- ▶ *Suillus luteus/granulatus* (Callampa de pino): Posee una textura consistente y gruesa en su carne, bastante esponjoso, donde es indispensable retirar la cutícula del sombrero, la cual es amarga, viscosa y laxante. Los tubos poseen una textura suave y espumosa



- ▶ *Ramaria flava* (Changle): El changle mide de 6 a 20 cm de alto, y de 10 a 15 cm de ancho. Con forma de coral, su cuerpo fructífero presenta varias ramificaciones hacia las puntas, de color amarillo azufre que va tornándose blanco hacia la base del estípite, que mide de 5 a 8 cm de alto por 4 a 7 cm de grosor. La característica principal que la diferencian de otras Ramarias es la terminación de sus ramificaciones en solo 2 puntas



- *Cyttaria espinosae/Cyttaria berteroii* (Digüeñe/Pina): El digüeñe es un parásito estricto y específico de *Nothofagus*, principalmente de *Nothofagus obliqua* y causa agallas cancerosas en las ramas, de las que emergen los cuerpos fructíferos desde primavera a principios de verano. En la gastronomía de Chile, el digüeñe es usualmente consumido fresco en ensaladas, frito con revuelto de huevo, en empanadas digüeñes a la parmesana, pollo relleno con digüeñes, tortilla de digüeñes o como acompañante de otros platos.

